

Перелік симптомів і захворювань, за яких пацієнту проводять обстеження на туберкульоз

1. Симптоми, яких проводять обстеження з метою виявлення ТБ легень:

1. кашель більше двох тижнів;
2. кровохаркання;
3. підвищена втомлюваність та слабкість;
4. підвищена пітливість, особливо вночі;
5. зменшення ваги тіла з невизначених причин;
6. підвищення температури тіла (має значення навіть незначне підвищення — до 37—37,2°C);
7. задишка за незначного фізичного навантаження;
8. біль у грудній клітці.

2. Симптоми, яких проводять обстеження з метою виявлення позалегеневого ТБ:

1. тривалий біль у хребті та великих суглобах нез'ясованої етіології;
2. збільшення периферичних лімфатичних вузлів нез'ясованої етіології;
3. хронічне захворювання нирок і сечовивідних шляхів;
4. безпліддя в жінок і чоловіків нез'ясованої етіології;
5. увеїт;
6. тривалий абдомінальний/епігастральний біль, асцит, діарея або закреп, мальабсорбція нез'ясованої етіології. За клінічними показаннями можуть обстежуватися також пацієнти з тривалими запальними процесами іншої локалізації, резистентними до лікування, яке проводять, а також у разі виявлення змін, що можуть свідчити про ТБ за результатами обстеження.

3. Симптоми та/або клінічні ознаки, за яких проводять обстеження з метою виявлення ТБ у дітей:

1. кашель, особливо якщо він постійний і тривалий;
2. тривале підвищення температури тіла (має значення навіть незначне підвищення — до 37—37,2°C) з нічним потовиділенням чи без;
3. погане харчування (втрата апетиту) або анорексія;
4. втрата ваги або погана прибавка у вазі*;
5. незвична стомлюваність, зниження грайливості або зниження активності;
6. тяжка гостра пневмонія, що пов'язана з іншими типовими ознаками ТБ як-то тривалі симптоми, контакт із ТБ в анамнезі, відсутність відповіді на емпіричну антибіотикотерапію або рецидивна пневмонія;
7. ознаки дихальної недостатності (втягнення грудної клітки, стридор, сатурація кисню нижче 90%) у поєднанні з іншими типовими ознаками ТБ (наприклад, погана прибавка у вазі, постійне підвищення температури тіла);
8. тяжкий гострий стан неповноцінного харчування, особливо за відсутності відповіді на нутритивну терапію;
9. наявність стійких хрипів, що не відповідають на бронходилататори (особливо фіксовані та несиметричні) та пов'язані з іншими типовими ознаками ТБ (наприклад, погана прибавка у вазі, постійна гарячка).

Перелік симптомів і захворювань, за яких пацієнту проводять обстеження на туберкульоз

4. Симптоми та/або клінічні прояви, за яких проводять обстеження з метою виявлення ТБ у новонароджених:

1. млявість;
2. підвищення температури тіла (має значення навіть незначне підвищення — до 37—37,2°C);
3. погане харчування, низька вага під час народження та погана прибавка у вазі*;
4. респіраторний дистрес-синдром;
5. клінічна картина «неонатального сепсису». Найважливіший показник для діагностики неонатального ТБ — наявність у матері в анамнезі захворювання на ТБ або ВІЛ-інфекції.

* Погана прибавка у вазі дитини може бути визначена наступними методами:

- повідомлено про помітну втрату ваги;
- дуже низька вага (Z-оцінка маси тіла до віку (МДВ) нижча за -3);
- недостатня вага (Z-оцінка МДВ нижча за -2);
- підтверджена втрата ваги (більше 5%) з моменту останнього відвідування;
- згладжування кривої зросту.

Примітка. Перелік наведений згідно з додатком 7 до Стандартів медичної допомоги «Туберкульоз», затверджених наказом МОЗ від 19.01.2023 № 102.