



ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ІНСУЛЬТІ



Симптоми інсульту

1



Раптова слабкість
у м'язах, оніміння
кінцівки,
м'язів обличчя
або однієї
половини тіла

2



Сильний
головний біль

3



Порушення зору
та слуху

4



Розлад мовлен-
ня. Сплутаність
свідомості

5



Нестійка хода,
раптова втрата
рівноваги.
Слинотеча
й утруднене
ковтання

Якщо сумніваєтеся, що у потерпілого інсульт, попросіть його



Підняти вгору
обидві руки.
При інсульті
це зробити
неможливо!



Повторити за вами
елементарну
фразу —
наприклад:
«Сьогодні видався
морозний день».
Хворий спотворить цю фразу
або навіть не зможе її вимовити



Висунути
язика — він буде
скошеним набік
або викривленим.
Усмішка хворого
також буде
кривою

Переконалися, що у працівника інсульт?

Тоді негайно викличте бригаду екстреної медичної допомоги та поінформуйте диспетчера про ваші підозри щодо причини розладу здоров'я потерпілого.

Якщо потерпілий у свідомості

- Покладіть його так, щоб голова та плечі розташовувалися вище тіла
- Уникайте пересування хворого
- Забезпечте вільне дихання
- Не давайте їсти та пити
- Не давайте ліки
- Очистіть ротову порожнину
- Вимірюйте пульс і тиск кожні 10 хвилин

Якщо потерпілий без свідомості, але дихає

Перемістіть його в безпечне положення. Хворий має лежати на боці з підкладеною під голову рукою. Голова при цьому має бути нахиленою вперед, а нога — зігнутою в коліні

Якщо потерпілий не дихає

Негайно розпочніть серцево-легеневу реанімацію

При інсульті НЕ можна

1



Приводити
до тями
хворого
нашатириком
спиртом

2



Різно знижувати тиск
за допомогою медичних
препаратів.
Давати ліки,
які розширюють судини, —
нош-пу, папаверин

3



Давати їсти
та пити

4



Дозволяти хворому
вставати. Вірити йому, якщо
він запевняє, що його стан
поліпшився