

Амбулаторний прийом потенційних носіїв SARS-CoV-2

Перед прийомом пацієнтів

- 1** Помийте руки упродовж 30—60 с та обробіть антисептиком теж упродовж 30—60 с згідно зі стандартним алгоритмом ВООЗ.
- 2** Перевірте наявність повної комплектації захисного одягу:
 - разової медичної маски/респіратора;
 - разової медичної шапочки;
 - двох пар разових рукавичок;
 - захисних окулярів;
 - разового халата.
- 3** Одягніть першу пару разових рукавичок.
- 4** Одягніть медичну маску/респіратор.
- 5** Одягніть разову медичну шапочку.
- 6** Одягніть захисні окуляри.
- 7** Одягніть разовий халат.
- 8** Одягніть другу пару рукавичок.
- 9** Зафіксуйте другу пару рукавичок на межі з разовим халатом лейкопластирем (чи іншим доступним матеріалом).



У такому вигляді працюйте з кожним пацієнтом до кінця прийому.

Примітка. Якщо одягаєте респіратор, то спочатку одягніть разову шапочку, а на шапочку — респіратор.

Під час прийому пацієнта

- 10** Одягніть третю пару рукавичок.

Після роботи з пацієнтом

- 11** Помийте руки упродовж 30—60 с.
- 12** Зніміть третю пару рукавичок, що контактували з пацієнтом, та замочіть їх у контейнері із деззасобами.
- 13** Не знімайте другу пару рукавичок та обробіть руки антисептиком упродовж 30—60 с.